

# ÁLGEBRA LINEAL

## Hoja de problemas 3

### Aplicaciones lineales

1. Sea  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  la aplicación lineal definida por:

$$f(x, y) = (x + y, 2x - y, 2x + 2y).$$

- (a) Hallar la matriz coordenada de  $f$  respecto de las bases canónicas.
- (b) Obtener bases, dimensión y ecuaciones del núcleo y de la imagen de  $f$ .
- (c) Hallar la matriz coordenada de  $f$  respecto de la base  $B = \{(1, 1), (-1, 2)\}$  de  $\mathbb{R}^2$  y de la base  $B = \{(-1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 0, 1)\}$  de  $\mathbb{R}^3$ .

2. Sea  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  la aplicación lineal dada por:

$$f(x, y, z) = (-2y, x - y + z, z + x).$$

- (a) Hallar la matriz de  $f$  respecto de la base  $B = \{(0, 2, 1), (1, 0, 1), (-1, 0, 0)\}$ .
- (b) Usar dicha matriz para calcular  $f(-2, 2, 2)$ .

3. Sea  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$  la aplicación lineal definida por:

$$f(1, 0, 1) = (1, 1, 1, 0)$$

$$f(-1, 2, 0) = (1, -3, 0, 1)$$

$$f(0, -1, -1) = (-1, 0, -1, 0)$$

Hallar la matriz asociada a  $f$  respecto a las bases canónicas y  $\text{Ker}(f)$ .

4. Sea  $f : \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^3$  la aplicación lineal definida por:

$$f\left(\begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}\right) = (x + y, z, -t).$$

Se pide:

- (a) Probar que efectivamente  $f$  es una aplicación lineal.
- (b) Obtener bases, dimensión y ecuaciones del núcleo y de la imagen de  $f$ .

5. Sea  $f : E \rightarrow \mathbb{R}^4$  la aplicación lineal definida por:

$$f(a_0 + a_1t + a_2t^2) = (a_0 + a_1 + a_2, a_0 - 2a_1, a_2, -a_0),$$

donde  $E$  es el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual que 2 con coeficientes reales. Hallar la matriz coordenada de  $f$  respecto de las bases

$$B_1 = \{1, t, t^2\}$$

y

$$B_2 = \{(1, 0, 0, 1), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1), (1, 1, 1, 0)\}.$$

Utilizar dicha matriz para hallar  $f(1 + t)$ .

6. Siendo  $E$  el espacio de los polinomios de grado menor o igual que 2 con coeficientes reales y  $F$  el espacio de las matrices cuadradas de orden 2 con elementos reales, se considera la aplicación lineal  $f : E \rightarrow F$  definida como sigue:

$$f(a + bt + ct^2) = \begin{pmatrix} p(0) & p(1) \\ p(1) & p(0) \end{pmatrix}.$$

Se pide:

- (a) Hallar la matriz coordenada de  $f$  respecto a la base

$$B_1 = \{1, 1 + t, 1 + t + t^2\}$$

de  $E$  y a la base canónica de  $F$ .

- (b) *Haciendo uso de la matriz hallada en (a)*, hallar  $f(p)$ , siendo  $p = 3 + 2t + t^2$ .  
 (c) *Haciendo uso de la matriz hallada en (a)*, hallar una base del subespacio  $\text{Ker}(f)$ .

7. Siendo  $E$  el espacio de las matrices cuadradas de orden 2 con elementos reales y  $F$  el espacio de los polinomios de grado menor o igual que 2 con coeficientes reales, se considera la aplicación lineal  $f : E \rightarrow F$  definida como sigue:

$$f\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = a + (b + c)t + dt^2.$$

Se pide:

- (a) Hallar la matriz coordenada de  $f$  respecto a la base

$$B_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

de  $E$  y a la base canónica de  $F$ .

- (b) *Haciendo uso de la matriz hallada en (a)*, hallar  $f(C)$ , siendo  $C = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ .

8. Siendo  $E$  el espacio de las matrices cuadradas de orden 2 con elementos reales se considera la aplicación lineal  $f : E \rightarrow E$  dada por

$$f(A) = A + A^T,$$

donde  $A^T$  es la matriz traspuesta de  $A$ .

Se pide:

- (a) Probar que efectivamente  $f$  es una aplicación lineal.  
 (b) Hallar la matriz coordenada de  $f$  respecto a la base

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

de  $E$ .

- (c) *Haciendo uso de la matriz hallada en (b)*, hallar  $f(C)$ , siendo  $C = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ .

9. Sea  $E$  el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 2 con coeficientes reales. Se considera la aplicación lineal  $f : E \rightarrow E$  dada por

$$f(p(t)) = p'(t)$$

(es decir la imagen de un polinomio es su derivada).

Se pide:

- (a) Hallar la matriz coordenada de  $f$  respecto a la base  $B = \{t, 1 + t, t^2\}$  de  $E$ .
- (b) *Haciendo uso de la matriz hallada en (a)*, hallar  $f(1 + 2t + 2t^2)$ .

10. Sean  $E$  el espacio de los polinomios de grado menor o igual que 2 con coeficientes reales y  $F$  el espacio de los polinomios de grado menor o igual que 3 con coeficientes reales. Se considera la aplicación lineal  $f : E \rightarrow F$  dada por

$$f(p(t)) = \int_0^t p(s) ds$$

(es decir la imagen de un polinomio es su integral entre 0 y  $t$ : una primitiva de dicho polinomio que en 0 toma el valor 0).

Se pide:

- (a) Hallar la matriz coordenada de  $f$  respecto a la base  $B = \{1, 1 + t, 1 + t^2\}$  de  $E$  y a la base canónica de  $F$ .
- (b) *Haciendo uso de la matriz hallada en (a)*, hallar  $f(3 + t + t^2)$ .